

สหรัฐฯพบ'ชิกา'ติดทางเพศสัมพันธ์

● ความคืบหน้าการระบาดของเชื้อไวรัสชิกา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ (ซีดีซี) ยืนยันว่า พบผู้ติดเชื้อไวรัสชิการายแรกที่เป็นกรณีติดเชื้อมาในสหรัฐฯที่รัฐเท็กซัส โดยผู้ติดเชื้อไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด แต่ยังไม่ระบุถึงสาเหตุการติดเชื้อ

ขณะที่หน่วยสาธารณสุขเขตดัลลาส รัฐเท็กซัส ระบุว่า ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิกาในเมืองดัลลาสรายนี้ ติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เนื่องจากผู้ป่วยไม่เคยไปพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค แต่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่กลับมาจากเวเนซุเอลา หนึ่งในพื้นที่ระบาด และเป็นกรณีที่สองที่ผู้เดินทางจากเวเนซุเอลาติดเชื้อไวรัสชิกาเข้าสู่สหรัฐฯ

ก่อนหน้านี้ในเดือนที่แล้ว ซีดีซี เปิดเผยว่าพบรายหนึ่งที่มีการติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์ และพบเชื้อในน้ำอสุจิของชายคนหนึ่งหลังจากตรวจไม่พบเชื้อในเลือด นอกจากนี้ ซีดีซี ระบุว่า หนทางที่ดีที่สุดในการหลีกเลี่ยงติดเชื้อไวรัสชิกา คือหลีกเลี่ยงการถูกยุงกัด และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำอสุจิจากคนที่ติดเชื้อชิกา รวมทั้งขอให้ผู้ชายที่กลับจากพื้นที่ระบาดใช้ถุงยางเวลามีเพศสัมพันธ์

เว็บไซต์ของซีดีซี ระบุว่า เคยพบผู้ติดเชื้อชิกาผ่านการมีเพศสัมพันธ์ในเฟรนช์ โพลินีเซีย ดินแดนของฝรั่งเศสในมหาสมุทรแปซิฟิก เมื่อปี 2556 ผู้เชี่ยวชาญกล่าวด้วยว่า ผู้ติดเชื้อไวรัสชิกาส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการ จึงมีความเสี่ยงของการติดเชื้อผ่านการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่มีอาการ และเรายังไม่รู้ว่าจะอยู่ในน้ำอสุจิได้นานแค่ไหน สะท้อนว่าเรายังขาดความรู้อีกมาก

วันเดียวกัน ภาซาดอเมริกา ได้ออกแถลงการณ์ขอให้ผู้ที่เพิ่งกลับจากการเดินทางไปพื้นที่ที่มีการระบาดของไวรัสชิกา หลีกเลี่ยงการบริจาคเลือดในช่วง 28 วัน

รศ.สุพัทธา ทองรุ่งเกียรติ นักวิจัยภาควิชาการแพทย์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ยุงลายที่เป็นพาหะโรคติดเชื้อไวรัสชิกา เป็นชนิดเดียวกับยุงพาหะไวรัสของไวรัสเดงกีและชิคุนกุนยา แต่สำหรับประเทศไทยเชื่อว่ายุงลายที่มีเชื้อชิกาจะมีปริมาณน้อย สะท้อนได้จากที่พบผู้ป่วยโรคชิกันน้อย

"มีทฤษฎีระบุว่ายุงหนึ่งตัวจะมีเชื้อไวรัสหนึ่งชนิด สำหรับประเทศไทยจึงยังถือว่าไวรัสเดงกียังเป็นเจ้าถิ่น แต่ยังคงศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้เชื้อไวรัสที่นำโดยยุงจะอยู่ในกระแสเลือดราว 10 วัน ดังนั้นหากยุงกัดในช่วงเวลานี้ก็จะได้รับเชื้อ แต่ถ้าพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จะไม่ได้เชื้อ การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือต้องกำจัดแหล่งยุงลาย" รศ.สุพัทธา กล่าว

ศ.นพ.ยง ภูววรรธน หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ความรู้เรื่องการถ่ายทอดไวรัสชิกาผ่านทางเพศสัมพันธ์ เป็นเรื่องที่ทราบมานานแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถถ่ายทอดผ่านทางน้ำนมและสายรกได้ด้วย และโรคที่นำโดยยุงโรคนั้นได้น่ากลัวอย่างโรคไข้เลือดออก แต่ที่เป็นปัญหาคือทำให้ทารกแรกคลอดมีศีรษะเล็ก พิจารณาทางสมองแต่กำเนิด ถ้าจะเปรียบชิกาก็เหมือนโรคหัดเยอรมันที่ไม่ได้รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตแต่ทำให้เด็กพิการ