



ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ภาควิชาโภชนศาสตร์เขตร้อนและวิทยาศาสตร์อาหาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์ 02-306-9195, 02-354-9100 ต่อ 1582



ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลสิ่งส่งตรวจ

ชื่อ - สกุล HN.
อายุ ปี เพศ [] ชาย [] หญิง
OPD/WARD Tel.
(สำหรับติดสติ๊กเกอร์)

Lab No.
การวินิจฉัยโรค แพทย์ผู้ส่งตรวจ.....

สิ่งส่งตรวจ

☐ Clotted blood ☐ EDTA ☐ Heparinized blood

☐ Other

วันที่ / / เวลาเก็บสิ่งส่งตรวจ

ชื่อผู้เจาะเลือดหรือเก็บตัวอย่าง.....

ชนิดการส่งตรวจ ☐ ปกติ ☐ ค่วน ☐ ไม่รอผล

สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

ผลการตรวจสอบสิ่งส่งตรวจ ☐ ผ่าน ☐ ไม่ผ่าน

เหตุผลการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ

☐ ความไม่สมบูรณ์ และไม่เหมาะสมของใบขอส่ง

☐ ลักษณะตัวอย่างไม่ถูกต้อง

☐ EDTA Clot

☐ Clotted blood มี Hemolysis > +2

☐ ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่เหมาะสม

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ

ข้อเสนอแนะการดำเนินการ ☐ เก็บตัวอย่างใหม่

☐ เขียนใบขอส่งใหม่

ผู้ตรวจสอบ วัน - เวลาที่รับ.....

รายการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ

HIS Code	TEST	ชนิดสิ่งส่งตรวจ/การเตรียมสิ่งส่งตรวจ	TAT (Day)	COST (Baht)
CNU001	[] Vitamin B1 in RBC	Heparin/EDTA 3 – 5 mL	3 – 7	500.-
CNU002	[] Vitamin B2 in RBC		3 – 7	500.-
CNU003	[] Vitamin B6 in RBC		3 – 7	500.-
CNU005	[] Folic acid in RBC + Serum		5 – 7	500.-
CNU006	[] Folic acid in Serum	Serum 1.0 mL หรือ Clotted blood 3 – 5 mL	5 – 7	250.-
CUN007	[] Vitamin A	Clotted blood/EDTA 3 – 5 mL หรือ Serum 1.0 mL * หากต้องการตรวจมากกว่า 3 การทดสอบ ต้องใช้เลือดอย่างน้อย 6 mL	5 – 10	1,000.-
CUN008	[] Vitamin E		5 – 10	1,000.-
CUN009	[] Vitamin B6 in Serum	Serum 2.0 mL	5 – 7	500.-
CUN012	[] Antioxidant วิธี ORAC	Clotted blood/EDTA 3 – 5 mL * หากต้องการตรวจมากกว่า 3 การทดสอบ ต้องใช้เลือดอย่างน้อย 6 mL	1 – 3	2,000.-
CUN013	[] Antioxidant วิธี FRAP		1 – 3	2,000.-
CUN014	[] Antioxidant วิธี ABTS		1 – 3	2,000.-
CUN015	[] Antioxidant วิธี ORAC, FRAP และ ABTS		1 – 3	5,000.-
CUN016	[] Vitamin D (Total 25-OH D2/D3)	Clotted blood/EDTA 3 – 5 mL หรือ Serum 1.0 mL * หากต้องการตรวจมากกว่า 3 การทดสอบ ต้องใช้เลือดอย่างน้อย 6 mL	5 – 10	1,500.-

หมายเหตุ: 1. สิ่งส่งตรวจทุกรายการทดสอบควรเก็บในภาชนะที่บ่ม โดยหุ้มอุณหภูมิต่ำหรือใส่ลงในช่องเยือกแข็งของยาพลาสติกสีน้ำเงิน และรักษาอุณหภูมิที่ 2-8 °C

ด้วย Ice pack ขณะนำส่ง ให้รีบนำส่งภายใน 24 ชั่วโมง

2. หากไม่สามารถนำส่งได้ในทันที ให้เก็บสิ่งส่งตรวจที่ -20 °C (สำหรับ Serum) และที่ 4 °C (สำหรับ Clotted blood/EDTA) แล้วนำส่งในวันถัดไป

3. ห้องปฏิบัติการขอปฏิเสธการรับตัวอย่างที่มี Hemolysis > +2 หรือ Clotted หรือ มีไขมันปะปนสูง (Lipemic)